

Bonete

Jacaratia mexicana

Sinónimos: *Carica mexicana*; *Pileus mexicanus*; *Leucopremna mexicana*; *Carica heptaphylla*; *Jacaratia conica*
¿Tienes alguna duda, sugerencia o corrección acerca de este taxón? [Envíanosla](#) y con gusto la atenderemos.

Fuente:

CONABIO (Resumen)

Descripción

El **bonete**, también conocido como **k'umché**, **cualsuayote**, **orejona**, **papaya de montaña** o **papayón** [2], es un árbol con tronco cónico, no ramificado (monopódico), cilíndrico y diámetro a la altura del pecho hasta 1 m y hasta 15 m de alto, con pocas ramas ascendentes u horizontales, frecuentemente en verticilos de 3 a 4, copa pequeña y poco densa. En árboles jóvenes, el tronco parece un poste enterrado, ya que el diámetro varía tenuemente en su base, donde aparecen ligeras proyecciones aplanadas, tubulares y angulares conocidas como contrafuertes. Corteza de color pardo; ramillas de cuarto orden de 5 a 7 mm de diámetro, cicatrices foliares semicirculares transversales, de aprox. 4 mm de diámetro. Hojas apicales en las ramillas de cuarto orden; peciolo de 3 a 7 cm de largo x 1 a 1.5 cm de diámetro; peciolulos de 1 a 3 mm de largo; foliolos 5, de 4 a 8 cm de largo y 3.7 cm de ancho, obovados, base cuneada, ápice acuminado, margen entero. Flores masculinas de 1.3 a 1.6 cm de largo, de color blanco o verdoso, estambres superiores opuestos a los lóbulos de la corola; estambres inferiores casi sésiles, anteras de aproximadamente 2 mm de largo. Flores femeninas con pedúnculos de 2.7 a 6 cm de largo; corola verde o verde amarillenta; estilo de 0.3 a 1 cm de largo, estigmas de 1 a 1.4 cm de largo, libres o fusionados, glandulosos, erectos, enteros o ramificados. Fruto tipo baya, hasta de 30 cm de largo y 13 cm de diámetro, pendulares, ovoides o cónicas; pedúnculos de 3 a 13 cm de largo; 5 costillas de hasta 4 cm de alto, proyectadas en la base 1.3 a 4 cm; base cóncava o truncada; pericarpio verde-rojizo o amarillo en la madurez; semillas de 4 a 8 mm de largo, de 2 a 5 mm de diámetro, de forma ovoide o subglobosas [1, 3].

Distribución potencial

Es una especie que tiene amplio rango de distribución en México, ya que se distribuye en nuestro país en la vertiente del pacífico y del Golfo de México. Por el lado de la vertiente del pacífico abarca los estados de; Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Del lado del Golfo de México, se ha localizado en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se ha localizado también en los estados de; Quintana Roo, Guanajuato, Puebla y Morelos. Fuera de nuestro país se tiene reportado en Nicaragua y el Salvador.

Vegetación

Es una especie que se ha localizado en bosque tropical caducifolio, en elevaciones de 740 a 1450 m, en la vertiente del pacífico y zona centro de México. Por la parte del golfo de México se tienen registros desde el nivel del mar hasta los 1400 msnm.

Importancia cultural y usos

Algunos la consideran como una especie vulnerable a la desaparición debido a la elevada tasa anual de devastación de su hábitat y su baja reproducción natural. Sin embargo, no es una especie considerada bajo ninguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2010 de la SEMARNAT. Tampoco se encuentra en la lista de la IUCN. Tiene usos culinarios y medicinales (Consulte a su médico).

Referencias

1 Lomelí- Sención, J.A. 1998 Descarga: 44466 CARICACEAE. Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Fascículo 21. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

2 Pennington T.D. & J. Sarukhán 2016 Descarga: Arboles tropicales de México: manual para la identificación de las principales especies 523 pp.

3 Moreno, Nancy P. 1980 Descarga: 44466 CARICACEAE. Flora de Veracruz. Fascículo 10. Instituto Nacional de Investigaciones de Recursos Bióticos. Xalapa, Veracruz. México.

Metadatos

- **Autor:** Elizabeth Torres Bahena
- **Grupo especializado:** Especialista en Contenidos
- **Institución afiliación:** CONABIO
- **Nombre completo del responsable de la captura de los datos:** Elizabeth Torres Bahena

-

Puesto y afiliación: Especialista en Contenidos, CONABIO